ANBAU**EMPFEHLUNG**

Agria.

Späte, gelbfleischige Haupternte-Sorte mit guten Erträgen und sehr konstanter Qualität.

- **Hervorragende Backqualität**
- **Mehrfache Virusresistenzen**
- **Gute Lagereigenschaften**

Biologisch

Verarbeitung
Pommes frites
Chips
Fertigprodukten

Einzelhandel
Frisch

Konventionell



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Böhm
Kreuzung: QUARTA x SEMLO
Züchterrecht: Abgelaufen
Setzling: BM 77-0945

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: spät / 5
Lichtkeim: blau-violett / BV
Blütenfarbe: weiß / W
Anzahl Beeren: keine / 8
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: gelb / 7
Schalenqualität: durchschnittlich / 6
Knollenform: ovallang / OL
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: relativ wenige / 5
Knollengröße: groß / 8
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: lang / 8

Empflindlichtkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: relativ empfindlich / 6
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: empfindlich / 5
Metribuzin: leicht empfindlich / 7,5
Metribuzin: leicht empfindlich / 7,5
Bentazon: relativ empfindlich / 6,5
Ethylen: 5% bis 15% mehr Knollen / 6
Unterwassergewicht: 402
Trockenmassegehalt: 21,8%
Kochtyp: mehlig / BC
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7
Rohverfärbung: leicht empfindlich / 7
Pommes-frites-Qualität: hervorragend / 8
Trockenmasseverteilung: durchschnittlich / 6,5
Chipsqualität: gut / 7
Gehalt an Glykoalkaloiden: 2,7

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAU**EMPFEHLUNG**

Anbauempfehlungen

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung - 10%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 10%.

Saatgutbehandlung

Empfohlen wird ein kurzer Hitzeschock oder eine gute Vorkeimung.Eine gute Vorkeimung nach Entfernung des oberen Keimlings kann den Knollenansatz positiv beeinflussen.

Pflanzabstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 Pflanzen/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang kann sich eine Laubreaktion, aber nur selten eine Ertragsverringerung ergeben.

Fungizide

Ein Präventiv-Spritzplan gegen Kraut- und Knollenfäule wird empfohlen.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens drei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 5 ºC. Für Verarbeitungszwecke nicht unter 7 ºC lagern. Geeignet für langfristige Lagerung.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: etwas anfällig / 6
Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8
Virus - Yntn (Knolle): etwas anfällig / 7
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 7
Krautfäule: anfällig / 5,5
Knollenfäule: etwas anfällig / 7
Fusarium: etwas anfällig / 6,5
Schorf: sehr anfällig / 4,5

Pulverschorf: sehr anfällig / 3
Schwarze Flecken: - / -
Warzenkrankheit F1: etwas anfällig / 9
Warzenkrankheit F6: relativ anfällig / 6
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: anfällig / 2
Weiße Nematoden Pa 3: anfällig / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl agricopotatoes.com