ANBAU**EMPFEHLUNG**

Beyonce.

Mittelspäte Chipssorte mit gutem Trockenmassegehalt, geeignet für mittelfristige Lagerung und mit Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.

- **Große Knollen**
- **Gute Keimruhe**
- **Relativ hoher Knollenansatz**

Biologisch

Verarbeitung
Chips
Flocken



Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: Agrico Research B.V.
Kreuzung: AR 94-2061 x LADY JO
Züchterrecht: 31-12-2049
Setzling: AR 08-3271

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelspät / 6
Lichtkeim: blau-violett / BV
Blütenfarbe: lila / P
Anzahl Beeren: sehr viele / 4
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7,5
Laub - Entwicklung Ende: gut / 8
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7,5
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: unterdurchschnittlich / 5,5
Knollenform: ovalrund / OR
Regelmäßigkeit der Knollenform: relativ regelmäßig / 6,5
Knollenansatz: relativ viele / 7
Knollengröße: relativ groß / 7,5
Größenregelmäßigkeit: regelmäßig / 7
Keimruhe: relativ lang / 7

Empflindlichtkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6
Schwarzfleckigkeit: leicht empfindlich / 7,5
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: relativ empfindlich / 6
Metribuzin: relativ empfindlich / 6,5
Metribuzin: leicht empfindlich / 7
Bentazon: leicht bis nicht empfindlich / 8
Ethylen: 5% weniger bis 5% mehr Knollen / 5
Unterwassergewicht: 446
Trockenmassegehalt: 23,9%
Kochtyp: mehlig / BC
Grauverfärbung (nach dem Kochen): leicht empfindlich / 7
Rohverfärbung: leicht bis nicht empfindlich / 8
Pommes-frites-Qualität: gut / 7
Trockenmasseverteilung: durchschnittlich / 6,5
Chipsqualität: hervorragend / 8
Gehalt an Glykoalkaloiden: 6,5

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAU**EMPFEHLUNG**

Anbauempfehlungen

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung + 25%.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Abkeimung kann sich negativ auf Ertrag und Größenuniformität auswirken.

Pflanzabstand

28/35 mm: 23 cm (58.000 Pflanzen/ha)
35/55 mm: 27 cm (50.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Bei einer Standardanwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang ergibt sich keine Laubreaktion oder Ertragsverringerung.

Fungizide

Ungeachtet der Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule ist auf Infektionen zu achten.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Für Verarbeitungszwecke nicht unter 9 ºC lagern. Geeignet für mittelfristige Lagerung.



Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: anfällig / 5,5
Virus - Yntn (Knolle): anfällig / 5
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 8,5
Knollenfäule: etwas anfällig / 7,5
Fusarium: etwas anfällig / 7,5
Schorf: anfällig / 5,5

Pulverschorf: etwas anfällig / 6
Schwarze Flecken: etwas anfällig / 7,5
Warzenkrankheit F1: - / -
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: anfällig / 4
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl agricopotatoes.com