Alouette.



Een middenlate, veelzijdige roodschillige biologische aardappel met Phytophthora-tolerantie in loof en knol, geschikt voor conventionele en biologische teelt.

- **Regelmatige vorm en sortering**
- **Geschikt voor diverse gerechten**
- **Goede droogtetolerantie**

MARKTSEGMENT

Verwerkende industrie
Koelvers

Retail
Vers

Traditioneel

TEELTAANBEVELING

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 02-139-1 x LAURA
Kwekersrecht: 31-12-2044
Zaailing: AR 04-3153

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: geel / 7,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6
Metribuzin - vóór opkomst: weinig gevoelig / 7,5
Metribuzin - ná opkomst: weinig gevoelig / 7
Bentazon: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% minder knollen / 4
Onderwatergewicht: 389
Drogestofgehalte: 21,1%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte: 3,6

Agrico BioSelect stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

BioSelect
an Agrico brand

Teeltadvies

agricobioselect.nl/alouette

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

1 Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft.Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor- en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

TEELTAANBEVELING

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Fusarium: weinig vatbaar / 7,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): partieel resistent / 8

Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -



BioSelect • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 63991 info@agrico.nl agricobioselect.nl

BioSelect
an Agrico brand