


Ditta.



Een veelzijdig, middenlaat biologisch aardappelras voor tafel- en saladesegment.

- ▶▶ Uitstekende consumptie kwaliteit
- ▶▶ Goede bewaarbaarheid
- ▶▶ Brede resistenties

MARKTSEGMENT



Retail
Vers, Salade

Algemene kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Kruising: BINTJE x QUARTA
Kwekersrecht: Verlopen
Zaailing: SW 80-0540

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: lang ovaal / LO
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschatiging: gevoelig / 5,5
Metribuzin - vóór opkomst: weinig gevoelig / 7
Metribuzin - ná opkomst: weinig gevoelig / 7
Bentazon: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: - / -
Onderwatergewicht: 369
Drogestofgehalte: 20,2%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte: -



agricobioselect.nl/ditta

TEELTADVIES

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

1 Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor- en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderiving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -

