Nofy.

Image:

Een laat zetmeelras met een goede opbrengst en natuurlijke resistentie tegen Phytophthora in loof en knol.

- **Hoog onderwatergewicht**
- **Geschikt voor lange bewaring**
- **Goede virusresistenties**

MARKTSEGMENT

Verwerkende industrie
Zetmeel

TEELTAANBEVELING

Algemene kenmerken

Kweker: AKV Langholt
Kruising: STAYER x AR 02-3921
Kwekersrecht: 31-12-2048
Zaailing: PL 08-4007

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: groen rood / GR
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 7
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: ovaal rond / OR
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 471
Drogestofgehalte: 25,2%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
TGA-gehalte (mg/100 gr): 15,37 mg/100g
S_Harvestability: gevoelig / 5,5

Agrico BioSelect stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

BioSelect
an Agrico brand

Teeltadvies

agricobioselect.nl/nofy

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 10%.Het is mogelijk om organische mest te gebruiken.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

1 Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.000 planten/ha)

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.

TEELTAANBEVELING

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 9

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Fusarium: - / -

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Zwarte spikkel: weinig tot niet vatbaar / 8

R_PCN Tolerance: - / -

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): weinig vatbaar / 6

Aardappelmoeheid Pa 2 (D): weinig vatbaar / 5

Aardappelmoeheid Pa 3 (E): vatbaar / 2

Image: