Agria.

Variété de conservation à chair jaune, à la qualité très stable et au bon rendement, destinée à la transformation.

- **Excellente qualité de friture**
- **Résistances à de multiples virus**
- **Bonne capacité de stockage**

Biologique

Industrie de transformation
Frites
Chips
4ème gamme

Frais

Consommation

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Böhm
Croisement: QUARTA x SEMLO
Droits d'obtenteur: Expiré
Code de semis: BM 77-0945

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 5
Couleur du germe: bleu violet / BV
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: nul / 8
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: moyenne / 6
Forme du tubercule: oblong long / OL
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: assez faible / 5
Taille du tubercule: gros / 8
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: longue / 8

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: assez sensible / 6
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: sensible / 5
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Bentazone: assez sensible / 6,5
Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6
Poids sous eau: 402
Matière sèche: 21,8%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7
Grisaillement: peu sensible / 7
Fritabilité: excellente / 8
Répartition de la matière sèche: moyenne / 6,5
Chipabilité: bonne / 7
Niveau de glyco-alcaloïde: 2,7

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

PRÉCONISATIONS CULTURALES

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard - 10%.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé.Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.

Densité de plantation

28/35 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha)
35/55 mm : 30 cm (45.000 plantes/ha)
50/55 mm : 40 cm (33.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.

Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 6
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7
Virus du mop top: peu sensible / 7
Mildiou du feuillage: sensible / 5,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 7
Fusariose: peu sensible / 6,5
Gale commune: très sensible / 4,5
Gale poudreuse: très sensible / 3
Dartrose: - / -
Galle verruqueuse F1: assez résistante / 9
Galle verruqueuse F6: assez sensible / 6
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: sensible / 2
Nématode blanc Pa 3: sensible / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com