Nirvana.

Variété de conservation précoce, adaptée à la fabrication de frites, résistante au mildiou.

- **Forte teneur en matière sèche**
- **Bonne répartition de la matière sèche**
- **Résistante au mildiou**

Biologique

Industrie de transformation
Frites

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: CAROLUS x PERFORMER
Droits d'obtenteur: 31-12-2051
Code de semis: AR 10-2460

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur du germe: rouge / R
Couleur de la fleur: violette / P
Nombre de baies: assez faible / 6,5
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: ferme / 8
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: assez terne / 5
Forme du tubercule: oblong / O
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: longue / 8

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: assez sensible / 6,5
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: sensible / 5
Métribuzine: sensible / 5,5
Métribuzine: peu sensible / 7
Bentazone: - / -
Éthylène: 25% de tubercules en plus / 8
Poids sous eau: 422
Matière sèche: 22,8%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
Grisaillement: sensible / 5
Fritabilité: bonne / 7
Répartition de la matière sèche: excellente / 8
Chipabilité: moyenne / 6
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,85

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard + 25%.

Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.

Densité de plantation

28/35 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha)
35/55 mm : 30 cm (45.000 plantes/ha)
50/55 mm : 40 cm (33.000 plantes/ha)

Désherbage

Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Protection fongicide

Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: sensible / 5,5
Virus - Y nécrotique (tubercule): sensible / 5,5
Virus du mop top: sensible / 5,5
Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9
Fusariose: peu à pas sensible / 8
Gale commune: sensible / 5
Gale poudreuse: peu à pas sensible / 8
Dartrose: sensible / 5,5
Galle verruqueuse F1: très sensible / 1
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: - / -
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: moyennement sensible / 5
Nématode blanc Pa 3: sensible / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com