ANBAU**EMPFEHLUNG**

Twister.

Mittelfrühe Speisesorte für den konventionellen und biologischen Anbau mit gutem Ertrag und Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule.

- **Ansprechendes Äußeres**
- **Gute Lagereigenschaften**
- **Relativ festkochend**

Biologisch **Einzelhandel** **Konventionell**
Frisch

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Züchter: G.W. te Winkel
Kreuzung: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Züchterrecht: 31-12-2048
Setzling: TW 08-1507

Kraut- und Knolleneigenschaften

Reifegruppe: mittelfrüh / 7
Lichtkeim: rot-violett / RV
Blütenfarbe: helllila / LP
Anzahl Beeren: überdurchschnittlich / 5,5
Laub - Entwicklung Anfang: relativ schnell / 7
Laub - Entwicklung Ende: relativ gut / 7,5
Laub - Festigkeit: relativ fest / 7
Schalenfarbe: gelb / Y
Fleischfarbe: hellgelb / 6,5
Schalenqualität: gut / 7
Knollenform: rundoval / RO
Regelmäßigkeit der Knollenform: regelmäßig / 7
Knollenansatz: durchschnittlich / 6
Knollengröße: relativ groß / 7
Größenregelmäßigkeit: relativ regelmäßig / 6,5
Keimruhe: relativ lang / 7

Empflindlichtkeit und Qualität

Durchwuchs: relativ empfindlich / 6,5
Schwarzfleckigkeit: leicht bis nicht empfindlich / 8
Wachstumsrisse: relativ empfindlich / 6,5
Ernteschäden: leicht empfindlich / 7
Metribuzin: sehr empfindlich / 3
Metribuzin: sehr empfindlich / 3
Bentazon: relativ empfindlich / 6
Ethylen: 5% weniger Knollen / 4
Unterwassergewicht: 345
Trockenmassegehalt: 19%
Kochtyp: vorwiegend festkochend / AB
Grauverfärbung (nach dem Kochen): relativ empfindlich / 6,5
Rohverfärbung: relativ empfindlich / 6
Pommes-frites-Qualität: ungeeignet / 5
Trockenmasseverteilung: - / -
Chipsqualität: ungeeignet / 4
Gehalt an Glykoalkaloiden: 5,63

Diese Sorten beschreibungen wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Da Kartoffeln ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für diese Angaben übernommen werden.

AGRICO

ANBAU**EMPFEHLUNG**

Anbauempfehlungen

Düngung [1]

Stickstoff: Standardempfehlung + 20%.
Phosphat: Standardempfehlung.
Potassium: Standardempfehlung.

Saatgutbehandlung

Kann direkt aus der Kühlung gepflanzt werden, vorzugsweise nach einem kurzen Hitzeschock.Einmalige Abkeimung ist möglich.

Pflanzabstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 Pflanzen/ha)
35/50 mm: 25 cm (54.000 Pflanzen/ha)

Unkraut

Keine Verwendung von Metribuzin (Sencor) nach dem Aufgang, da sich eine starke Laubreaktion und eine starke Ertragsverringerung ergeben können.

Fungizide

Ungeachtet der Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule ist auf Infektionen zu achten.

Ernte

Aufgrund der Anfälligkeit für Schwarzfleckigkeit und/oder Ernteschäden nach dem Krautschlagen mindestens zwei Wochen bis zur Ernte warten.

Lagertemperatur - Lagerzeit

Die optimale Lagertemperatur beträgt 6 ºC.
Geeignet für mittel- bis langfristige Lagerung.

Say potato, say Agrico.

Resistenzen

Virus - Blattrollen: - / -
Virus - Yn: kaum bis nicht anfällig / 8
Virus - Yntn (Knolle): kaum bis nicht anfällig / 8
Pfropfenbildung: etwas anfällig / 6
Krautfäule: kaum bis nicht anfällig / 9
Knollenfäule: kaum bis nicht anfällig / 9
Fusarium: etwas anfällig / 6
Schorf: etwas anfällig / 6

Pulverschorf: anfällig / 5
Schwarze Flecken: etwas anfällig / 7
Warzenkrankheit F1: moderat anfällig / 8
Warzenkrankheit F6: - / -
Warzenkrankheit F18: - / -
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 1/4: resistent / 9
Gelbe Kartoffelnematoden Ro 2/3: - / -
Weiße Nematoden Pa 2: - / -
Weiße Nematoden Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63991 info@agrico.nl agricopotatoes.com